Mamíferos de Santa Elena

Especie	Foto	Huellas	Descripción
XENARTHA			
Armadillo *Dasypus Novemcinctus*			Es un mamífero acorazado de cuerpo pequeño. Tiene unas patas pequeñas, pero muy adaptadas para excavar, garras. Su armadura es una pequeña lámina ósea cubierta con un número de 5 a 9 duros anillos. Su cuerpo mide 50-60 cm y pesa entre los 4 y 8 kg. Es de hábitos nocturnos y se alimenta de raíces tuberosas, lombrices, caracoles, insectos y larvas, aunque prefiere las termitas y las hormigas. Da a luz de 4 a 10 crías, el periodo reproductivo es de agosto a noviembre y el periodo de gestación de 120 días.
LAGOMORPHA			
Conejo castellano *Sylvilagus floridanus*			Es de color marrón rojizo o marrón grisáceo. Tiene una grandes patas posteriores, orejas largas y una cola larga y esponjosa de color blanco. La parte del vientre es blanca. El conejo adulto pesa en promedio 1.2 kg y mide 43 cm de largo. Se alimenta de muchas especies de plantas, hierbas, arbustos y árboles, dependiendo cual esté disponible. Tienen tasas de reproducción de hasta 35 conejos al año. Pueden tener camadas de 1 a 7 conejos y pueden tener hasta 7 camadas al año.
RODENTIA			
Metorito mexicano *Microtus mexicanus*			Es de tamaño mediano, tiene pelo largo y suave, la coloración dorsal es café oscuro, los lados son más claros y el vientre es grisáceo. La cola tiene dos colores. Se reconoce por su nariz plana, cola corta y orejas chicas y redondas. Pesa de 26 a 43 gr. Son activos de día y de noche, utilizan caminos y túneles subterráneos para moverse. Son muy sociales y viven en grupos familiares de 2 a 8 individuos. Se alimentan principalmente de raíces, tallos y hojas de plantas herbáceas. Se reproducen a lo largo del año, pero principalmente de mayo a agosto y tienen en promedio 3 crías. Son cazados principalmente por coyotes, búhos, linces y cascabeles.

Ratón ciervo *Peromyscus maniculatus* **A**			Es un ratón pequeño, de 8 a 10 cm sin incluir la cola. Tienen ojos y orejas grandes que les dan muy buena vista y oído. Su suave pelaje varía en color de blanco a negro, pero todos tienen un envés y patas blancas. Son de hábitos nocturnos, pasan el día en áreas como árboles o madrigueras donde tiene nidos de material vegetal. Los ratones ciervos pueden reproducirse a lo largo del año, aunque en la mayoría de sus áreas de reproducción, se reproducen de marzo a octubre. Los períodos de gestación oscilan entre 22 y 26 días. Son omnívoros; su dieta incluye generalmente las semillas, las frutas, los artrópodos, las hojas, y los hongos. Especie amenazada
Ardilla de Peter *Sciurus oculatus* **Pr**			Es una ardilla de tamaño grande, de 508mm a 560mm y pesan de 550 a 750 gr. La coloración del pelo varía ligeramente entre subespecies. Pero en general, la coloración dorsal es gris y a través de la base se convierte de café a negro. Las partes ventrales varían de blanco a amarillo ocre pálido. La coloración dorsal de la cola es negra, mientras la parte ventral es negra con un borde de pelo con puntas blancas. Los anillos de los ojos están bien diferenciados o blancos o de color crema. La característica más importante es la carencia del tercer premolar superior. Se alimentan principalmente de piñas y bellotas, pero también se alimentan de higos silvestres. Se cree que la época reproductiva es en el verano Especie rara
Ardilla voladora *Glaucomys volans* **A**			Crecen un máximo de 285 mm y son de color café grisáceo en las untas y negro en la base del pelaje de los costados y arriba de la nariz y color crema debajo del vientre y debajo de la nariz. Se caracterizan por presentar las extremidades anteriores y posteriores conectadas por un pliegue de piel totalmente cubierto con pelo con un borde negro (patagio) que les permite planear cuando sus patas están muy estiradas; la cola está cubierta con una capa densa de pelo, es ancha, aplanada y con la punta redondeada. Tienen los ojos muy grandes en comparación con su tamaño; las orejas son rosas y no tienen pelo dentro. Pueden tener de 1 a 7 crías, que gestan aproximadamente 60 días y nacen completamente pelonas y pesan de 3-5 gramos. Especie amenazada
CARNIVORA			
Zorra gris *Urocyon cinereoargenteus*			Es de tamaño similar que un coyote, pero con el hocico más corto y agudo, las orejas más desarrolladas y las patas más cortas. El pelaje es gris oscuro o plateado en el dorso, volviéndose rojizo en los flancos y las patas y blanco en el vientre. Una banda de pelo negro cruza el cuerpo desde la nuca hasta la punta de la cola. La cola es espesa y muy poblada. Cazan pequeños animales como pájaros, ardillas y ratones y complementan su dieta con pequeños frutos y carroña. Son monógamos y se reproducen al principio de la primavera, unos dos meses después las hembras paren a un número variable de crías que maduran hasta el año de edad. Pueden vivir 8 años de edad, las hembras son de un tamaño un poco menor que los machos.

Comadreja cola larga *Mustela frenata*			Son de cuerpo largo y esbelto, piernas cortas y una cola peluda casi tan larga como el resto del cuerpo del animal. Los machos adultos miden de 35 a 45 centímetros (incluyendo la cola), y pueden pesar hasta 500 gramos; las hembras son usualmente un 15% más pequeñas. Tienen un color marrón claro, con la piel del vientre amarillenta, pero en la parte norte de su hábitat este muda a color blanco puro en invierno. La punta de la cola es negra en todas las estaciones. Son muy solitarias. La comadreja de cola larga es un carnívoro. come principalmente ratas, ratones, conejos, tuzas y ardillas listadas. La época de crianza generalmente es en julio y agosto siendo concebido en el mes de abril.
Coyote *Canis familiaris*			Cánidos de tamaño mediano, los adultos pesan de 8 a 16 kg. Son de color gris castaño en el dorso y blanco grisáceo en el vientre y en la parte interna de las patas. Cola espesa y orejas puntiagudas. Es activo de día y de noche. Es un animal solitario, pero pueden formar parejas estables y se pueden observar grupos familiares. El periodo de gestación varía alrededor de 60 días y la camada consta de 1 a 7 crías y son destetadas hacia el mes y medio o 2 meses de edad.
Cacomixtle norteño *Bassariscus astutus* **A**			Tiene un pelaje de colores que van del gris amarillento al marrón oscuro, con el vientre y el pecho de color blanco y una llamativa cola negra con anillos blancos más larga que su cuerpo. Los ojos son grandes y de color púrpura y están rodeados por una mancha de pelaje más claro. Mide de unos 30 a 42 cm, con una cola de 31 a 44 cm. Es un animal nocturno, tímido, solitario y que no se deja ver con facilidad. Es omnívoro, alimentándose con frutas, bayas, insectos, lagartijas, pequeños roedores y pájaros. Se aparean en la primavera El período de gestación es de unos 45-50 días, durante los cuales el macho se encargará de proveer comida a la hembra. La camada es de 2 a 4 cachorros. Especie amenazada
Mofeta moteada *Spilogale putoris*			Es un pequeño zorrillo, mide de 40- 58 cm. La cola ocupa una tercera parte de su longitud. Tiene un denso pelo negro con 4 a 6 rayas en la espalda que tienen un patrón roto, dándole una apariencia de estar manchado. Tienen una pequeña mancha blanca en la frente. Son tanto diurnos como nocturnos. Se aparean en los últimos meses de invierno y tienen crías a finales de la primavera o principios de verano. En promedio tienen de 4 a 5 crías al mismo tiempo. Toma 12 semanas antes que las crías se desarrollen como adultos y dos meses después para que produzcan almizcle para defenderse de sus depredadores.

Mapache boreal *Procyon lotor*			Puede pesar de 5,5 a 15 kilos. Es característica la coloración oscura de su piel alrededor de los ojos y la cola con colores claros y oscuros alternados como anillos. El pelaje puede ser de color gris, marrón o negro. Los mapaches tienen 40 dientes adaptados a una dieta omnívora. El apareamiento tiene lugar durante los meses de enero y febrero, naciendo las camadas en abril o mayo según el clima. Los mapaches acostumbran a vivir en los huecos en los árboles, madrigueras en el suelo o en pequeñas cuevas. El cuidado de las crías queda a cargo de las hembras. A finales del verano, estas se independizan de las madres. Su esperanza de vida ronda entre los 12 años.
ARTIODACTYLA			
Venado cola blanca *Odocoileus virginianus*			En Norteamérica los machos pesan entre 60 y 160 kg, y las hembras entre 40 y 105 kg. Incluida la cola, miden entre 1,60 y 2,20 m de largo. El manto de color pardo grisáceo en las tierras altas y frías. La punta de la cola es blanca, lo que le sirve para batirla como señal de alarma. Los machos presentan cornamentas ramificadas e inclinadas hacia atrás que alcanzan entre 8 y 64 cm desde la base y se renuevan cada año, en el invierno, después del apareamiento. Las hembras están en celo durante la segunda mitad del otoño. Los machos compiten por ellas y se enfrentan en combates uno contra otro. Un macho copula con cuantas hembras le es posible. Tras siete meses de gestación nacen desde una hasta tres crías.
DIDELPHIMORPHIA			
Tlacuache norteño *Didelphis virginiana*			Especie de marsupial nocturno y solitario. Mide de 35 a 94 cm sin cola, la cola mide de 27 a 47 cm. Tiene una cabeza triangular y una nariz larga. Su pelaje tiene dos capas: una densa y de color crema y otra de pelos largos de color gris o negro. Las mejillas son de color blanco y la primera parte de la cola es negra, la cola es prensil. Tiene un pulgar oponible en las patas traseras. La época reproductiva puede ser en cualquier época y pueden tener dos camadas al año, de 1 a 10 crías. La gestación dura solo 13 días y las crías migran al marsupio donde se aferran a una teta y permanecen 2 meses. Es omnívoro y su dieta incluye desde frutas, plantas, insectos y animales pequeños.

*A- Especie Amenazada según la NOM 059
*Pr- Especie sujeta a protección especial según la NOM 059

*Las imágenes de las huellas fueron obtenidas del Manual para el rastreo de mamíferos silvestres de México de Marcelo Aranda

Fotos de las cámaras trampa de Santa Elena

Ardillas (*Sciurus oculatus*)

Zorra gris (Urocyon cinereoargenteus)

Coyote (Canis familiaris)



Cacomixtle norteño (Bassariscus astutus)

Venado cola blanca (Odocoyleus virginianus)

Conejo castellano (Sylvilagus floridanus)